

PORTFÓLIO CULTIVARES

SEMENTES DE SOJA • 2023/24

NOSSA MISSÃO É PRODUZIR
AS MELHORES
SEMENTES DO BRASIL

viG®
sementes

Uma marca

ARAGUAIA®

Quem SOMOS?

Somos a Vig Sementes, uma marca da empresa Araguaia, produtora de sementes de soja. Situada em uma região privilegiada para a produção de sementes, na cidade de Vianópolis em Goiás (1.000 metros de altitude), a Vig Sementes conta com campos de produção instalados em cooperados que utilizam da mais alta tecnologia de produção, em áreas férteis e bem manejadas, capazes de produzir sementes de alto poder germinativo e vigor.

Após a colheita, nossas sementes são beneficiadas em equipamentos de alta performance e armazenadas em câmaras frias com temperatura abaixo de 14°C e umidade controlada, até o momento da expedição.

Uma marca da Araguaia, que a mais de 45 anos vem se consolidando entre as maiores e mais respeitadas distribuidoras de fertilizantes e produtos agropecuários do Centro Oeste. A Vig Sementes não tem como propósito ser a maior sementeira do Brasil, mas ter a melhor qualidade de sementes, que possa levar os agricultores a produzir mais.



PORTFÓLIO
CULTIVARES
SEMENTE DE SOJA • 2023/24

ARAGUAIA[®]



Estruturas **MODER NAS**

O contínuo investimento em melhorias de processos e equipamentos, garantem uma excelente classificação de sementes e plantabilidade. Após envazadas, as sementes são mantidas em armazéns 100% refrigerados, preservando elevados índices de Germinação e Vigor até o momento da entrega do cliente.

Controle de **QUALI DADE**

A qualidade de sementes é um fator decisivo para o sucesso de uma lavoura. Segundo pesquisa realizada pela Embrapa, sementes com alto poder germinativo e alto vigor, agregam de 25-30% na produtividade. Nosso laboratório segue um rigoroso protocolo nas análises, para certificar que o agricultor receba sementes com elevados índices de GERMINAÇÃO e VIGOR. Nosso objetivo é entregar aos nossos clientes somente lotes acima de 90% de germinação.

RASTREABILIDADE via QR-Code.





Tratamento de sementes

INDUS TRIAL

O TSI garante mais comodidade, segurança e eficiência aos produtores, melhora significativamente o revestimento e a plantabilidade das sementes. Consiste na aplicação e distribuição uniforme de inseticidas, fungicidas e inoculantes longa-vida pela superfície das sementes, utilizando doses recomendadas para o controle eficiente de insetos e fungos que acometem a cultura no início do seu desenvolvimento.

Nosso tratamento industrial com o sistema “Abra e Plante”, já está inoculado e adicionado cobalto e molibdênio (CoMo).




Fortaleza é marca registrada Syngenta. Rizoliq LLI é marca registrada Rizobacter.

Grupos de MATURI DADE

A duração do ciclo de desenvolvimento da soja (semeadura até a maturidade fisiológica), é determinada pela resposta ao fotoperíodo, práticas de manejo e área geral de adaptação das cultivares de soja.

No Brasil, para definir o ciclo das variedades, utiliza-se o conceito de Grupos de Maturação (GM). De forma conceitual, quanto menor o GM, mais precoce é a variedade.



Variedades de
SEMENTES



Variedades de

SEMENTES

BOM POTENCIAL PRODUTIVO
E BOA ESTABILIDADE ALIADA
COM PRECOCIDADE.



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.6



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
MÉDIA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:
-

*Acamamento suscetível

DOENÇAS

S MS MR R

Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14 e 14+				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

REC	REGIÕES	SET			OUT			NOV			DEZ			CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	Dias	Mil Plantas/ha
301	Sudoeste GO - Centro - Norte MS													112 a 118	240-280
302	Sul GO- Norte SP- Pontal triângulo													112 a 118	240-280
303	Triângulo mineiro - Alto Paranaíba													112 a 118	240-280
304	Leste - Noroeste de Minas													116 a 122	240-280

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.



Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL
PRODUTIVO, PRECOCIDADE
E PORTE CONTROLADO.



neogen



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS

- 

GRUPO DE MATURAÇÃO:

6.8
- 

EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:

ALTA
- 

RAMIFICAÇÃO:

BAIXA
- 

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

INDETERMINADO
- 

PMG:

163g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES			
Cisto (Raça 3)			
Galha			

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET				OUT				NOV				DEZ				CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		-	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	-				
BA	405 Oeste (Irrigado)																	102	320-380
DF	304 (Irrigado)																	100	300-360
	304 (Sequeiro)																	100	320-380
	301 Sudoeste																	101	320-380
GO	302 Sudoeste e Sul																	99	320-380
	303 Centro Sul																	109	260-340
	304 Leste (Irrigado)																	100	300-360
	304 Leste (Sequeiro)																	100	320-380
	302 Sul																	120	250-300
MG	302 Triângulo																	109	260-340
	302 Pontal																	109	260-340
	303 Alto Paranaíba																	109	260-340
	304 Noroeste (Irrigado)																	100	300-360
	304 Noroeste (Sequeiro)																	100	320-380
MS	301 Norte																	101	320-380
SP	302 Norte																	109	240-280

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
COM MUITA ESTABILIDADE E
ELEVADO PESO DE GRÃOS.



neogen

CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS

- 

GRUPO DE MATURAÇÃO:

7.1 (M3 e 401 Centro-Oeste), 7.3 (M4 e M5)
- 

EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:

ALTA
- 

RAMIFICAÇÃO:

BAIXA
- 

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

INDETERMINADO
- 

PMG:

192g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14 e 14+				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET					OUT					NOV					DEZ					CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		-	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	-	01	05	10	15	20	25		
																						Dias	Mil plantas/ha
DF	304 (Irrigado)																					106	250-300
	304 (Sequeiro)																					106	280-350
GO	301 Sudoeste																					106	280-350
	302 Sudoeste e Sul																					100	280-350
	303 Centro Sul																					106	280-350
	304 Leste (Irrigado)																					106	250-300
	304 Leste (Sequeiro)																					106	280-350
	401 Centro-Oeste																					106	280-350
MA	404 Norte																					106	280-320
	501 Batavo																					94	320-420
	302 Sul																					120	220-280
	302 Triângulo																					111	250-300
MG	302 Pontal																					111	250-300
	303 Alto Paranaíba																					111	250-300
	304 Noroeste (Irrigado)																					106	250-300
	304 Noroeste (Sequeiro)																					106	280-350
MS	301 Norte																					106	280-320
	301 Norte Arenoso																					113	280-320
MT	401 Sul																					100	350-400
	402 Médio-Norte																					98	350-400
	402 Oeste																					97	350-400
	403 Vale do Araguaia																					99	350-400
RO	402 Alta (Acima de 400m altitude)																					97	350-400
	404 Baixo (Abaixo de 400m altitude)																					97	250-320
SP	302 Norte																					120	220-280
TO	Campos Lindos																					94	320-420

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

■ Preferencial
■ Tolerada

VOLTAR << PRÓXIMO >>

Variedades de

SEMENTES

RESPONSIVA EM CONDIÇÕES DE ALTA TECNOLOGIA, EXCELENTE ASPECTO VISUAL A CAMPO E PORTE CONTROLADO.



neogen

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- **GRUPO DE MATURAÇÃO:**
7.2 (M3 e 401 Centro-Oeste GO), 7.4 (M4)
- **EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:**
ALTA
- **RAMIFICAÇÃO:**
BAIXA
- **HÁBITO DE CRESCIMENTO:**
INDETERMINADO
- **PMG:**
171g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET : OUT : NOV : DEZ												CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO		
		-	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20			25	-
DF	304 (Irrigado)															109	250-300
	304 (Sequeiro)															109	280-350
GO	301 Sudoeste															110	280-350
	302 Sudoeste e Sul															105	280-350
	303 Centro Sul															116	240-280
	304 Leste (Irrigado)															109	250-300
	304 Leste (Sequeiro)															109	280-350
	401 Centro-Oeste															109	300-350
MG	404 Norte															108	320-400
	302 Sul															121	200-260
	302 Triângulo															116	240-280
	302 Pontal															116	240-280
	303 Alto Paranaíba															116	240-280
	304 Noroeste (Irrigado)															109	250-300
MS	304 Noroeste (Sequeiro)															109	280-350
	301 Norte															110	280-350
MT	401 Sul															102	350-400
	402 Médio-Norte															100	380-420
	402 Oeste															100	380-420
	403 Vale do Araguaia															102	380-420
RO	402 Alta (acima 400m altitude)															100	380-420
	402 Baixa (abaixo 400m altitude)															100	280-350
SP	302 Norte															116	240-280

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

-
- Preferencial
-
- Tolerada

VOLTAR

PRÓXIMO

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, RESPONSIVA
EM CONDIÇÕES DE ALTA TECNOLOGIA,
RESISTÊNCIA AO ACAMAMENTO E
EXCELENTE ASPECTO VISUAL A CAMPO.



neogen



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.4 (M3) Centro-Oeste GO), 7.7 (M4 e M5)



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
BAIXA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:
168g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3	
Cisto Raça 6	
Cisto Raça 9	
Cisto Raça 10	
Cisto Raça 14 e 14+	
Galha	

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	OUT															NOV															DEZ	JAN															CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	-	01	05	10	15	20	25	Dias	Mil plantas/ha																											
BA	405 Oeste (Irrigado)																														108	350-400																	
DF	304 (Irrigado)																														109	320-400																	
	304 (Sequeiro)																														109	350-450																	
GO	301 Sudoeste																														113	350-420																	
	302 Sudoeste e Sul																														105	350-420																	
	303 Centro Sul																														109	350-450																	
	304 Leste (Irrigado)																														109	320-400																	
	304 Leste (Sequeiro)																														109	350-450																	
	401 Centro-Oeste																														111	350-420																	
	404 Norte																														111	320-400																	
MA	501 Batavo																														102	450-500																	
MG	302 Sul																														128	320-350																	
	302 Triângulo																														116	320-400																	
	302 Pontal																														116	320-400																	
	303 Alto Paranaíba																														116	320-400																	
	304 Noroeste (Irrigado)																														109	320-400																	
	304 Noroeste (Sequeiro)																														109	350-450																	
	301 Norte																														113	350-420																	
MS	301 Norte Arenoso																														113	350-420																	
MT	401 Sul																														107	380-420																	
	402 Médio-Norte																														104	380-420																	
	402 Oeste																														104	380-420																	
	403 Vale do Araguaia																														105	380-420																	
PA	501 Sul																														100	400-450																	
	502 Norte																														100	400-450																	
RO	402 Alta (acima 400m altitude)																														106	380-420																	
	402 Baixa (abaixo 400m altitude)																														106	280-350																	
SP	302 Norte																														128	320-350																	
TO	404/501 Transição																														103	450-500																	
	501 Campos Lindos																														102	450-500																	

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

VOLTAR



PRÓXIMO



Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
COM MUITA ESTABILIDADE E
ELEVADO PESO DE GRÃOS.



neogen



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS

GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.5

EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA

RAMIFICAÇÃO:
BAIXA

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO

PMG:
162g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14 e 14+				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	CICLO MÉDIO POPULAÇÃO																									
		OUT					NOV					DEZ					JAN					Dias	Mil plantas/ha				
		01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25		
BA	405 Oeste (Irrigado)																									107	320-400
DF	304 (Irrigado)																									111	280-300
	304 (Sequeiro)																									111	280-320
	301 Sudoeste																									113	280-320
GO	302 Sudoeste e Sul																									105	280-320
	303 Centro Sul																									111	280-320
	304 Leste (Irrigado)																									111	280-300
	304 Leste (Sequeiro)																									111	250-320
	401 Centro-Oeste																									113	280-320
	404 Norte																									112	280-350
MA	501 Batavo																									99	350-420
MG	302 Sul																									130	250-280
	302 Triângulo																									120	250-300
	302 Pontal																									120	250-300
	303 Alto Paranaíba																									120	250-300
	304 Noroeste (Irrigado)																									111	280-300
	304 Noroeste (Sequeiro)																									111	280-320
MS	301 Norte																									113	280-320
	301 Norte Arenoso																									113	280-320
	401 Sul																									106	350-400
MT	402 Médio-Norte																									98	350-400
	402 Oeste																									100	350-400
	403 Vale do Araguaia																									100	350-400
PA	501 Sul																									103	350-420
	502 Norte																									97	350-420
RO	402 Alta (acima 400m altitude)																									104	350-400
	402 Baixa (abaixo 400m altitude)																									104	250-320
SP	302 Norte																									130	250-280
TO	404/501 Transição																									100	380-420
	501 Campos Lindos																									99	350-420

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

VOLTAR << PRÓXIMO >>

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO COM MUITA ESTABILIDADE E ELEVADO PESO DE GRÃOS. PACOTE DE BIOTECNOLOGIA CONKESTA E3.



neogen

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.5 (M3 e 401 Centro-Oeste GO), 7.6 (M4)



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
BAIXA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:
175g (M3 e Centro-Oeste GO), 161g (M4)

*STS tolerante a sulfoniluréias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14				
Cisto Raça 14+				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET	OUT	NOV	DEZ	CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		-	01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25	-	Dias	Mil plantas/ha
DF	304 (Irrigado)					109	250-300
	304 (Sequeiro)					109	250-320
	301 Sudoeste					116	250-320
	302 Sudoeste e Sul					110	250-320
GO	303 Centro Sul					115	240-280
	304 Leste (Irrigado)					109	250-300
	304 Leste (Sequeiro)					109	250-320
	401 Centro-Oeste					110	250-350
MG	404 Norte					108	250-320
	302 Triângulo					120	240-280
	302 Pontal					120	240-280
	303 Alto Paranaíba					120	240-280
MS	304 Noroeste (Irrigado)					109	250-300
	304 Noroeste (Sequeiro)					109	250-320
	301 Norte					116	250-320
	401 Sul					105	320-380
MT	402 Médio-Norte					101	350-400
	402 Oeste					100	350-400
	403 Vale do Araguaia					105	350-400
	402 Alta (acima 400m altitude)					105	350-400
RO	404 Baixo (abaixo 400m altitude)					105	250-300
	302 Norte					120	240-280

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

VOLTAR << PRÓXIMO >>

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
COM MUITA ESTABILIDADE E
ELEVADO PESO DE GRÃOS.



neogen

CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.6



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
BAIXA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:
186g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14 e 14+				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET	OUT	NOV	DEZ	CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		-	01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25	-	Dias	Mil plantas/ha
MT	401 Sul					102	320-380
	402 Médio-Norte					99	350-400
	402 Oeste					102	350-400
	403 Vale do Araguaia					100	350-400
RO	402 Alta (Acima de 400m de altitude)					102	350-400
	404 Baixo (Abaixo de 400m de altura)					101	250-300

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTAMENTE RESPONSIVA A ÉPOCA DE PLANTIO E POPULAÇÃO, AMPLIA A JANELA DE PLANTIO DA SEGUNDA SAFRA E RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO.



neogen

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:

7.7



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:

ALTA



RAMIFICAÇÃO:

MÉDIA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

INDETERMINADO



PMG:

159g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14 e 14+				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET	OUT	NOV	DEZ	CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		-	01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25	-	Dias	Mil plantas/ha
DF	304 (Irrigado)					118	240-280
	304 (Sequeiro)					118	260-320
GO	301 Sudoeste					118	260-320
	302 Sudoeste e Sul					112	260-320
	303 Centro Sul					124	220-280
	304 Leste (Irrigado)					118	240-280
	304 Leste (Sequeiro)					118	260-320
MG	401 Centro-Oeste					112	280-350
	302 Triângulo					124	220-280
	302 Pontal					124	220-280
	303 Alto Paranaíba					124	220-280
	304 Noroeste (Irrigado)					118	240-280
MS	304 Noroeste (Sequeiro)					118	260-320
	301 Norte					118	260-320
SP	302 Norte					124	220-280

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial

Tolerada

VOLTAR << PRÓXIMO >>

Variedades de

SEMENTES

ALTÍSSIMO POTENCIAL PRODUTIVO,
ESTABILIDADE, AMPLA REGIÃO
DE ADAPTAÇÃO E EXCELENTE
DESENVOLVIMENTO INICIAL.



neogen

CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:

7.7 (405 Oeste BA), 7.8 (M3 e 401 Centro-Oeste GO)
e 7.9 (M4 e M5)



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:

BAIXA (M3 e 401 Centro-Oeste GO), MÉDIO (M4 e M5)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:

168g (M4 e M5), 181g (M3 e 401 Centro-Oeste GO)

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

*Meridionalis

NEMATOIDES

Cisto Raça 3	
Cisto Raça 6	
Cisto Raça 9	
Cisto Raça 10	
Cisto Raça 14 e 14+	
Galha	

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	CICLO MÉDIO																				POPULAÇÃO					
		OUT					NOV					DEZ					JAN										
		01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	Dias	Mil plantas/ha
BA	405 Oeste (Irrigado)																									116	180-250
DF	304 (Irrigado)																									120	160-200
	304 (Sequeiro)																									120	180-220
GO	301 Sudoeste																									120	180-240
	302 Sudoeste e Sul																									114	180-240
	303 Centro Sul																									124	180-220
	304 Leste (Irrigado)																									120	160-200
	304 Leste (Sequeiro)																									120	180-220
MA	401 Centro-Oeste																									114	180-260
	404 Norte																									115	180-250
	501 Batavo																									107	250-320
	501 Sul																									107	300-350
MG	302 Triângulo																									124	160-200
	302 Pontal																									124	160-200
	303 Alto Paranaíba																									124	160-200
	304 Noroeste (Irrigado)																									120	160-200
MS	304 Noroeste (Sequeiro)																									120	180-220
	301 Norte																									120	180-240
	301 Norte Arenoso																									118	180-240
MT	401 Sul																									110	250-300
	402 Médio-Norte																									107	250-320
	402 Oeste																									107	250-320
	403 Vale do Araguaia																									111	250-320
PA	501 Sul																									106	250-320
	502 Norte																									105	250-320
PI	501 Sul																									106	300-350
RO	402 Alta (acima 400m altitude)																									109	250-320
	402 Baixa (abaixo 400m altitude)																									109	200-280
SP	302 Norte																									124	160-200
	404 Sul																									114	220-300
TO	501 Campos Lindos																									106	250-320
	501 Norte																									106	250-320

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

VOLTAR

PRÓXIMO

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
COM RESISTÊNCIA A CISTO.



neogen



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
8.1



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
MÉDIA / ALTA



RAMIFICAÇÃO:
BAIXO (MA e TO), MÉDIA (MT, RO e BA)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:
162g (MT e RO), 170g (BA, MA e TO)

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

NEMATOIDES				
Cisto Raça 3				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	CICLO MÉDIO																POPULAÇÃO
		SET				OUT				NOV				DEZ				
		-	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	-	Dias	Mil plantas/ha	
BA	405 Oeste (Irrigado)																121	180-250
	405 Oeste (Sequeiro)																119	220-300
MA	501 Batavo																109	240-320
MT	401 Sul																123	220-300
	402 Médio-Norte																111	250-320
	402 Oeste																111	250-320
	403 Vale do Araguaia																117	250-320
RO	402 Alta (acima 400m altitude)																112	250-320
	402 Baixa (abaixo 400m altitude)																112	200-280
TO	404/501 Transição																110	240-320
	501 Campos Lindos																109	240-320

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
COM MUITA ESTABILIDADE E
ELEVADO PESO DE GRÃOS.



neogen



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS

- GRUPO DE MATURAÇÃO:**
8.2
- EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:**
MÉDIA/ALTA
- RAMIFICAÇÃO:**
MÉDIA
- HÁBITO DE CRESCIMENTO:**
INDETERMINADO
- PMG:**
205g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

NEMATOIDES

Cisto				
Galha				

S: Suscetível **MS:** Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente **R:** Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	CICLO MÉDIO																				POPULAÇÃO					
		OUT					NOV					DEZ					JAN										
		01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	Dias	Mil plantas/ha
BA	405 Oeste (Irrigado)																									123	180-240
	405 Oeste (Sequeiro)																									122	200-280
GO	404 Norte																									120	180-250
MA	501 Batavo																									119	250-300
	501 Sul																									116	280-320
MT	401 Sul																									117	220-300
	402 Médio-Norte																									109	250-320
	402 Oeste																									117	250-320
	403 Vale do Araguaia																									113	250-320
PA	501 Sul																									115	250-320
	502 Norte																									109	250-320
PI	501 Sul																									119	280-320
RO	402 Alta (acima 400m altitude)																									115	250-320
	402 Baixa (abaixo 400m altitude)																									115	200-280
TO	404 Sul																									120	200-300
	501 Campos Lindos																									119	250-300
	501 Norte																									114	250-320

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

- Preferencial
- Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
E ADAPTABILIDADE. IDEAL
PARA ÁREAS DE ABERTURA.



neogen

CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
8.4



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
ALTA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
DETERMINADO



PMG:
172g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14 e 14+				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET	OUT	NOV	DEZ	CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		-	01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25	-	Dias	Mil plantas/ha
MT	401 Sul					123	220-300
	402 Médio-Norte					111	250-320
	402 Oeste					111	250-320
	403 Vale do Araguaia					117	250-320
RO	402 Alta (Acima de 400m de altitude)					112	250-320
	404 Baixo (Abaixo de 400m de altura)					112	200-280

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

BOA UNIFORMIDADE E ESTRUTURA
DE PLANTAS. EXCELENTE POTENCIAL
PRODUTIVO COM TECNOLOGIA ENLIST.



neogen

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- **GRUPO DE MATURAÇÃO:**
7.1
- **EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:**
ALTA
- **RAMIFICAÇÃO:**
MÉDIA
- **HÁBITO DE CRESCIMENTO:**
INDETERMINADO
- **PMG:**
186g

DOENÇAS

NEMATOIDES	S	MS	MR	R
Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				
Cisto Raça 14				
Cisto Raça 14+				
Galha				

S: Suscetível **MS:** Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente **R:** Resistente

UF	MICRO E REGIÕES	SET	OUT	NOV	DEZ	CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		-	01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25	-	Dias	Mil plantas/ha
DF	304 (Irrigado)					108	240-280
	304 (Sequeiro)					108	260-320
GO	301 Sudoeste					106	260-320
	302 Sudoeste Sul					104	260-320
	303 Centro Sul					116	240-280
	304 Leste (Irrigado)					108	240-280
	304 Leste (Sequeiro)					108	260-320
	302 Sul					120	200-260
MG	302 Triângulo					116	240-280
	302 Pontal					116	240-280
	303 Alto Paranaíba					116	240-280
	304 Noroeste (Irrigado)					108	240-280
MS	301 Norte					106	260-320
SP	302 Norte					116	240-280

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

■ Preferencial
■ Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL
PRODUTIVO, ELEVADO PESO
DE GRÃOS E PRECOCIDADE.



SoyTech™

CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.0



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
MÉDIA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:
192g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				
Necrose da Haste				
Podridão R. de Fitóftora				

NEMATOIDES

Cisto Raça 3		
Cisto Raça 6		
Cisto Raça 9		
Cisto Raça 10		
Cisto Raça 14 e 14+		
Galha		

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

REC	REC E REGIÕES	SET			OUT			NOV			DEZ			POPULAÇÃO
		01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	
202	Arenito													260-280
204	Grande Dourados													260-280
204	Serra													260-280
201/203	Norte PR / Sul PR													280-300
301	Chapadões													290
301	MS Norte													290
301/401	Sudoeste GO													310-320
302/303	Pontal MG / Sul GO													310-320
303	Triângulo MG / Sudoeste GO													260
304	GO / MG													300
401	Grande Primavera													370-390
401	MT Sul													370-390
402	BR 162													370-390
402	Parecis													370-410
402	RO													320-330
403	Vale do Araguaia													360-390
404	Norte GO													320-340
404	TO Sul													370
405	BA													380
501	Norte TO / Sul PA													370

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ESTABILIDADE PRODUTIVA, ELEVADO PESO DE GRÃOS E EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO.



SoyTech™

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.5



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
MÉDIA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
INDETERMINADO



PMG:
204g

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				
Necrose da Haste				

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 14				
Galha				

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

REC	REC E REGIÕES	SET			OUT			NOV			DEZ			POPULAÇÃO
		01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	Mil plantas/ha
301/401	Sudoeste GO													260-280
301	Chapadões													260-280
301	MS Norte													260-280
302/303	Pontal MG / Sul GO													260-280
303	Triângulo MG / Sudoeste GO													260-280
304	GO / MG													280-300
404	Norte GO													300-320
401	Grande Primavera													340-380
401	MT Sul													320-340
402	Parecis													360-380
402	RO													320-340
402	BR 163													340-360

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
COM RESISTÊNCIA A CISTO.
VIABILIDADE DA SAFRINHA.



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS

- **GRUPO DE MATURAÇÃO:**
7.2
- **EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:**
ALTA
- **RAMIFICAÇÃO:**
MÉDIA
- **HÁBITO DE CRESCIMENTO:**
INDETERMINADO
- **PMG:**
180g
- *Acamamento suscetível

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				

NEMATOIDES				
Cisto Raça 1				
Cisto Raça 3				
Cisto Raça 6				
Cisto Raça 9				
Cisto Raça 10				

S: Suscetível **MS:** Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente **R:** Resistente

REGIÕES	FERTILIDADE	SET				OUT				NOV				DEZ				CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		07	14	21	30	07	14	21	31	07	14	21	30	07	14	21	31		
MT (Médio-Norte)	Média																	98 a 102	280-340
	Alta																		
MT / RO	Média																	100 a 103	260-320
	Alta																		
MT (Vale do Araguaia)	Média																	98 a 102	280-340
	Alta																		
MT (Sul)	Média																	106 a 110	240-280
	Alta																		
MS (Norte)	Média																	106 a 110	240-280
	Alta																		
GO (Sudoeste)	Média																	106 a 110	240-280
	Alta																		
GO (Norte)	Média																	106 a 110	240-280
	Alta																		
MG (Triângulo)	Média																	113 a 116	220-260
	Alta																		
SP (Norte)	Média																	113 a 116	220-260
	Alta																		

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, AMPLA ADAPTABILIDADE DE REGIÕES, RESISTÊNCIA AO ACABAMENTO, PERMITE O PLANTIO DE MILHO E ALGODÃO SEGUNDA SAFRA E POSSUI ELEVADO PESO DE GRÃOS (PMG).



TMG



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.4



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
ALTA



RAMIFICAÇÃO:
MÉDIA



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
SEMIDETERMINADO



PMG:
187g

*Acamamento resistente

DOENÇAS

S MS MR R

Cancro da haste*		
Mancha olho de rã		
Pústula Bacteriana		

NEMATOIDES

Cisto		
Cisto Raça 10		

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

REGIÕES	FERTILIDADE	SET				OUT				NOV				DEZ				CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		07	14	21	30	07	14	21	31	07	14	21	30	07	14	21	31		
MT (Médio-Norte)	Média																	98 a 103	360-420
	Alta																		
MT / RO (Parecis)	Média																	102 a 106	360-420
	Alta																		
MT (Vale do Araguaia)	Média																	100 a 103	360-420
	Alta																		
MT (Sul)	Média																	108 a 111	320-400
	Alta																		
MS (Norte)	Média																	108 a 111	320-400
	Alta																		
GO (Sudoeste)	Média																	108 a 111	320-400
	Alta																		
GO (Norte)	Média																	108 a 111	320-400
	Alta																		
MG (Triângulo)	Média																	115 a 118	320-400
	Alta																		
BA (Oeste)	Média																	115 a 118	320-400
	Alta																		

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

VOLTAR

PRÓXIMO

Variedades de

SEMENTES

BOM POTENCIAL PRODUTIVO E
POSSIBILITA ABERTURA DE PLANTIO.



TMG



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
7.9



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
MÉDIA/ALTA



RAMIFICAÇÃO:
-



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
SEMIDETERMINADO



PMG:
141g a 165g

*Acamamento mod. resistente

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha Alvo				
Pústula Bacteriana				

NEMATOIDES

Cisto Raça 3				
Cisto Raça 14				
Galha (M. incógnita)				

S: Suscetível **MS:** Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente **R:** Resistente

REGIÕES	FERTILIDADE	SET				OUT				NOV				DEZ				CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		07	14	21	30	07	14	21	31	07	14	21	30	07	14	21	31		
MT (Médio-Norte)	Alta																	106 a 111	280-340
	Média																		
MT/RO (Parecis)	Alta																	110 a 114	220-280
	Média																		
MT (Vale do Araguaia)	Alta																	108 a 113	300-360
	Média																		
MT (Sul)	Alta																	116 a 121	240-320
	Média																		
MS (Norte)	Alta																	125 a 130	200-280
	Média																		
GO (Sudoeste)	Alta																	127 a 132	260-260
	Média																		
GO	Alta																	127 a 132	280-320
	Média																		
MG (Triângulo)	Alta																	128 a 133	240-280
	Média																		
BA (Oeste)	Alta																	120 a 125	300-360
	Média																		
MA	Alta																	108 a 113	300-360
	Média																		
TO	Alta																	108 a 113	300-360
	Média																		
PI	Alta																	108 a 113	300-360
	Média																		

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada

Variedades de

SEMENTES

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
COM RESISTÊNCIA A CISTO.
RUSTICIDADE.



TMG



CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS



GRUPO DE MATURAÇÃO:
8.3



EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE:
MÉDIA / ALTA



RAMIFICAÇÃO:
-



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
SEMIDETERMINADO



PMG:
160g a 190g

*Acamamento resistente

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste*				
Mancha olho de rã				
Pústula Bacteriana				
Podridão radicular de fitóftora				

NEMATOIDES

Cisto Raça 1		
Cisto Raça 3		
Rotylenchulus reniformis		

S: Suscetível MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente R: Resistente

REGIÕES	FERTILIDADE	SET				OUT				NOV				DEZ				JAN				CICLO MÉDIO	POPULAÇÃO
		07	14	21	30	07	14	21	31	07	14	21	30	07	14	21	31	07	14	21	31		
MT (Médio-Norte)	Alta																					115 a 118	220-280
	Média																						260-320
MT / RO	Alta																					116 a 120	220-280
	Média																						260-320
MT (Vale do Araguaia)	Alta																					113 a 117	220-280
	Média																						260-300
MT (Sul)	Alta																					124 a 126	240-260
	Média																						260-280
MS (Norte)	Alta																					128 a 133	200-240
	Média																						200-240
GO	Alta																					130 a 135	200-260
	Média																						220-300
MA	Alta																					110 a 114	220-300
	Média																						220-340
TO	Alta																					110 a 114	220-300
	Média																						220-340
PI	Alta																					110 a 114	220-320
	Média																						220-340
BA (Oeste)	Alta																					128 a 132	200-280
	Média																						240-300
PA (Sul)	Alta																					112 a 116	240-280
	Média																						260-320
PA (Nordeste)	Alta																					112 a 116	240-280
	Média																						240-320

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas. Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após emergência.

Preferencial
Tolerada


VOLTAR

PRÓXIMO



**PLANTE
REFÚGIO**

COMO ADOTAR O REFÚGIO?



IMPORTANTE RESPEITAR

Tamanho mínimo da área /
Distância máxima de 800 metros

Plante REFÚGIO

**PARA CUIDAR DA BIOTECNOLOGIA
QUE TE AJUDA A PRODUZIR MAIS
E MELHOR.**

E COMO FUNCIONAM AS ÁREAS DE REFÚGIO?

Para que o refúgio seja efetivo, deve-se plantar sementes Bt em 80% da área total de soja e 20% de sementes não Bt, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas com soja Bt. Isso ajuda a retardar a multiplicação de insetos resistentes à tecnologia Bt, diminuindo sua vida útil e consequente benefício ao agricultor.

O QUE É O REFÚGIO?

É o plantio de sementes sem a tecnologia Bt em uma parte da área total do talhão plantado com a tecnologia Bt. Componente fundamental do Manejo Integrado de Pragas (MIP), o refúgio contribui para preservar os benefícios da tecnologia, pois ajuda a retardar a seleção de insetos resistentes à biotecnologia.

-  Refúgio não Bt
-  Cultura Bt

O que difere a plataforma **INTACTA 2 XTEND** frente a tecnologia IPRO?



LAGARTAS



CHRYSODEIXIS INCLUDENS



ANTICARSIA GEMMATALIS



CHLORIDEA VIRESCENS



CROCIDOSEMA APOREMA



HELICOVERPA ARMIGERA



SPODOPTERA COSMIOIDES



PROTEÍNA BT

CRY1AC

CRY1AC/
CRY1A.105/
CRY2AB2

HERBICIDAS



GLIFOSATO



DICAMBA



* Posicionamento do DICAMBA no plante e aplique.

v i g[®] s e m e n t e s

Uma marca  **ARAGUAIA[®]**



(62) 3907-0400



vigsementes.com.br



Rod. GO-010 • KM 5 • Vianópolis • GO

